

# Post-partum

Q160

Température Phlébite Surveillance Rééducation

Post-partum = Période qui va de l'accouchement jusqu'au retour de couches (= 1<sup>ères</sup> règles normales)

## Surveillance clinique

### • SUITES DE COUCHES

#### ➤ En salle de travail

- ❑ Surveillance obligatoire en salle de travail pdt les 2 premières heures après l'accouchement
  - Pouls, TA, coloration cutanée, T°C ttes les 1/2 h
  - Saignement vaginal à quantifier, Globe utérin tjs tonique

#### ➤ En chambre

- ❑ Température Pouls et TA (2 fois par jour)
- ❑ Palpation quotidienne des mollets (douleur, œdème, Homans, chaleur, ↓ ballotement)
- ❑ Lever précoce (6<sup>h</sup>-8<sup>h</sup>), bas de contention si mauvais réseau veineux, parfois HBPM si patiente à risque
- ❑ Perte sanguine à quantifier surtout le 1<sup>er</sup> jour
  - si perte > 500 cm<sup>3</sup> => hémorragie de la délivrance
- ❑ Involution utérine : palpation quotidienne afin de surveiller l'involution utérine (localisation, consistance, dl ?)
  - J1 : utérus ombilical, J7 : mi distance pubis-ombilic<sup>Q+</sup>, J15 : ne dépasse plus symphyse pubienne ; Utérus dur et sous ombilical
  - J6 : col ouvert au max à 1 doigt ; J15 : col fermé
- ❑ Possibilité de contractions utérines peu douloureuses (appelées « tranchées ») surtout chez multipares et lors des tétées (ocytocine), les 2 à 3 premiers jours. Physiologiques, inconstantes, elles cèdent aux antispasmodiques si intolérables
- ❑ Les lochies = écoulement vulvaire d'origine utérine : abondance, odeur, aspect (caillots, purulents, trop saignant pr la date)
  - Les premiers jours : sanglantes et fluides (sang non coagulé)
  - Fin de la première semaine : rosées, sérosanguinolant
  - Séreuse jusqu'à J15 où elles se tarissent normalement
  - Vers le 15<sup>ème</sup> jours : « petit retour de couche »<sup>Q</sup> inconstant (recrudescence de l'écoulement, + abondant et sanglant, pendant 24 – 48 h ; correspondant à la chute de l'escarre provenant de la zone d'insertion du placenta)
- ❑ Seins = palpation, surveillance, recherche montée de lait vers J3-J4 => cf
- ❑ Cicatrices de césarienne ou d'épisiotomie (doit rester propre et sèche +++)
- ❑ Fonctions sphinctériennes
  - Rétention urinaire : vérifier la possibilité d'uriner ds les h qui suivent l'accouchement.
  - IU d'effort, parfois incontinence anale
  - Constipation est fréquente
  - Crise hémorroïdaire ds les 8 premiers jours (congestion veineuse, constipation, effort expulsif +++): veinotonique + antiinflammatoires locaux
- ❑ Evaluation de la relation mère enfant : post-partum blues<sup>Q</sup>, psychose puerpérale (risque d'infanticide)
- ❑ Information individuelle, éducation de la mère (données de base de puériculture), surtout si 1<sup>er</sup> enfant
- ❑ Contraception
  - En tenant compte de l'hypercoagulabilité au cours des 2<sup>èmes</sup> semaines<sup>Q+</sup> et de l'allaitement ou pas (passage des stéroïdes dans le lait maternel) :
    - Contraception locale : préservatifs et spermicide (à privilégier les 15 premiers jours)
    - Oestroprogestatifs minidosés débutés 15 jours après accouchement chez les femmes qui n'allaitent pas
    - Progestatifs purs microdosés chez les mères qui allaitent dès leur sortie de la maternité
    - DIU : possible qu'après retour de couches
- ❑ Prévoir la prévention rhésus en cas de mère Rh- et enfant Rh+ par Ig anti D ds les 72 h.

### • RETOUR DE COUCHES ET EXAMEN POSTNATAL

#### ➤ Retour de couches = 1<sup>ères</sup> règles normales

- En l'absence d'allaitement : surviennent de 6 sem à 12 sem après l'accouchement
- Si allaitement : peut être retardé jusqu'au 5<sup>e</sup> mois (mais l'allaitement n'empêche pas ni l'ovulation, ni la fécondation) !!!

#### ➤ Examen postnatal obligatoire (au 2<sup>e</sup> mois après l'accouchement)

- Examen général : poids, PA, examen cardio-pulmonaire, muscles abdo, seins
- Examen gynéco :
  - Vulve et périnée : cicatrices (épisiotomie, déchirures...), dyspareunie ?, recherche prolapsus et IU d'effort
  - Spéculum : frottis de dépistage, ectropion cervical assez fréquent
  - TV : orifice cervical déhiscent, corps utérin de taille normale
  - Testing des releveurs
- Vaccination contre la rubéole si non immunisé

#### ➤ Rééducation périnéale (10 séances remboursées)

#### ➤ Contraception

#### ➤ Vécu de l'accouchement, de l'enfant...

# Complications

## • DES SUITES DE COUCHES

### ➤ Hémorragie de la délivrance

### ➤ Infections puerpérales

- ❑ **Germe** : strepto, staph, colibacilles
- ❑ **Origine** : voies génitales et aire placentaire avec propagation par voie canalaire, veineuse et lymphatique
- ❑ **Favorisées par** : toxémie, anémie, accouchement long, rupture prolongée des membranes, hémorragie de la délivrance, manœuvres endo-utérines, césarienne
- ❑ **Prévention** : dépistage + ttt infections génitales, asepsie de l'accouchement et des suites de couches, nbre min de TV nécessaire

#### ▪ ENDOMETRITE PUERPERALE

- Qq jours après l'accouchement (J3-J4)
- **Signes généraux** : 38 – 38,5°, élévation FC +/- AEG
- **Lochies abondantes fétides** (=>bactério ++)
- **Mauvaise involution** = Utérus gros, mou, douloureux, avec col ouvert
- **Signes négatifs** : **culs-de-sacs libres et indolores**, **seins ↓**, **ECBU –**
- **Bilan** : NFS (HLPN), VS élevé, Prelevement bacterio (lochies, endocol), ECBU
- Diagnostic difficile dans formes frustes et formes hémorragiques (Dc ≠ tiel avec rétention placentaire)
- **TTT** = ATB + utéro-toniques (Méthergin<sup>Q+</sup>)
  - Amoxicilline + Metronidazole ou Amoxicilline + Ac.clavulanique

#### ▪ COMPLICATIONS DE L'ENDOMETRITE

- **Pelvipéritonite des suites de couches => extension au paramètre, trompes, péritoine**
  - Vers la fin 1ère semaine, suite à endométrite méconnue non traitée, aggravation des signes généraux : 39 – 40°
  - Douleurs pelviennes intenses, état sub-occlusif, défense sus-pubienne
  - TV : utérus bloqué et douloureux, culs-de-sac vaginaux empâtés et douloureux
- **Collections suppurées secondaires à l'endométrite** (abcès du Douglas, phlegmon du ligament large...)
- **Péritonites généralisées** (exceptionnelles)
- **Thrombophlébites pelviennes suppurées** des troncs veineux latéro-utérins secondaires à l'endométrite
  - **Signes généraux inquiétants** : fièvre désarticulée avec frissons
  - **Signes de phlébite pelvienne** : **douleur latéro-utérine**, **empâtement** ou **cordon unilatéral douloureux**
- **Septicémies puerpérales** (gravissimes) compliquant une thrombophlébite pelvienne suppurée
  - Syndrome général grave : fièvre ++ avec frissons, tachycardie, prostration, faciès septique
  - HAA

### ➤ Maladie thrombo-embolique veineuse

- ❑ **Facteurs favorisants** : stase veineuse, augmentation de la masse sanguine, hyperpression veineuse des MI, hypercoagulabilité sanguine, sédentarité, anémie, infection
- ❑ **Signes pelviens** (la thrombose débute au niveau des veines pelviennes en général) : **Troubles urinaires** (pollakiurie, gêne à la miction, cystalgie), **troubles digestifs aspécifiques**
- ❑ **Signes cruro-jambiers unilatéraux** : pesanteur, tension, fourmillement, crampes musculaires, douleur du mollet, examen du mollet
- ❑ **Signes généraux** : tachycardie, puis décalage thermique, angoisse
- ❑ **Signes thoraciques à rechercher** : sensation de constriction thoracique, accès d'angoisse, point de côté brutal, EP peut être inaugurale (et fatale si massive) => ECG, Rx Thorax, Echodoppler Veineux

### ➤ Troubles psychologiques Q 248

- ❑ « **Post-partum blues** »<sup>Q</sup>
  - Très fréquent (**50 %** des accouchées) : tristesse, irritabilité, tble du sommeil au 3<sup>ème</sup> jour svt contemporaine de la montée laiteuse<sup>Q+</sup> ou de difficultés à l'allaitement
- ❑ **Dépression du post-partum**
  - **10 à 15 %** des cas, début + tardif : **vers 4 – 6 sem** après l'accouchement
  - Pleurs, labilité de l'humeur, sentiment de découragement, difficultés d'endormissement
  - Sont caractéristiques : sentiment d'incapacité à s'occuper de l'enfant, absence de plaisir à faire les soins, agressivité vis-à-vis de l'entourage familial et principalement du conjoint
  - Dépistage précoce ++ pour prise en charge adaptée et éviter troubles du comportement et retards d'acquisition chez l'enfant
- ❑ **Psychose puerpérale**
  - **0,2 %** des naissances, état confuso-onirique aigu brutal, **12 – 15 jours après l'accouchement**
  - Confusion avec désorientation, troubles de l'identification des proches + manifestations oniriques (avec tableaux inquiétants voire terrifiants).
  - Parfois apparition d'un état mélancolique ou d'un état pseudo-maniaque
  - Evol : risque de **suicide ou d'infanticide**
  - Ttt = isolement en milieu psychiatrique, en général guérison totale à distance

## • DU RETOUR DE COUCHES

### ➤ Hémorragies

- ❑ Endométrite en général, **Rarement rétention placentaire** (a minima)
- ❑ Réaliser une **échographie** (échos intrautérins : placenta ou caillot ?), **pas de curetage** (risque de synéchie, perforation,...), à traiter par **ATB et utérotonique**.

### ➤ Aménorrhée

- ❑ Absence de règles **3 mois** après accouchement en absence d'allaitement, **5 mois** après si allaitement
  - **GROSSESSE (!)**
  - **AMENORRHEES SANS DECALAGE THERMIQUE**
    - **Anovulation par inertie hypothalamo-hypophysaire transitoire**
      - Pas de bouffées de chaleur, FSH et oestrogènes bas, endomètre atrophique
      - Cycle menstruel se remet le + svt spontanément en place
    - **Aménorrhées d'origine ovariennes**
      - Bouffées de chaleur, FSH élevés et stéroïdes ovariens effondrés, endomètre atrophique
      - Seul ttt possible = cycle artificiel => en général réversible mais peut être un début de ménopause précoce
  - **AMENORRHEES AVEC COURBE THERMIQUE BIPHASIQUE** : synéchie utérine totale secondaire à une manœuvre endo-utérine (curetage intempestif en post partum) : Sd d'Asherman
  - **SYNDROME DE SHEEHAN** (rare)
    - **Nécrose ischémique hypophysaire** (secondaire à une hémorragie grave non compensée survenue lors de l'accouchement ou de la délivrance)
    - **Pan-hypopituitarisme +/- complet** en fonction de l'étendue de la nécrose : **Agalactie** (pas de montée laiteuse), **aménorrhée**, **atrophie génitale**, **insuffisance thyroïdienne**, **insuffisance cortico-surrénalienne** (asthénie profonde, hypoglycémies), **PAS de cachexie**
    - Tableau souvent dissocié
    - Ttt = hormonothérapie substitutive
    - **Prévention** +++ = prophylaxie des hémorragies obstétricales, compensation exacte et rapide de tte spoliatio sanguine

## Allaitement et ses complications<sup>Q+</sup>

### • PHYSIOLOGIE

- ❑ **Pendant grossesse, préparation à la lactation par :**
  - Hormone placentaire lactogène **HPL** (trophicité mammaire)
  - **Œstrogène** (dvpt ex galactophores)
  - Progestérone (croissance acini glandulaire mais blocage de la sécrétion lactée, inhibition de la Prolactine)
- ❑ **Accouchement** : Chute importante des oestro et progest entraînant **la levée du rétrocontrôle négatif hypothalamique** (PIF) et augmentation de la sécrétion de Prolactine = **hyperprolactinémie**.
- ❑ **Entretien de la sécrétion lactée :**
  - **Réflexe neuro-hormonal** : Succion => hypothalamus => **prolactine** (hypophyse ant, action sur sécrétion par les acini) et **ocytocine** (hypophyse post, contraction des fibres musculaires et évacuation)
  - **Secondairement autonomisation de la glde mammaire** : la simple vidange des acinis suffit à maintenir la lactation. L'axe hypothalamo-hypophysaire n'intervient plus. Disparition de l'hyperprolactinémie au 3<sup>ème</sup> mois.

### • MODALITES

- ❑ **Mise en route dès que possible, en salle d'accouchement**, pour favoriser montée laiteuse
  - Installation confortable, alterner les seins, tétée lorsque enfant réclame, laisser < 20 min chacun
- ❑ **Montée laiteuse : vers 3<sup>e</sup> – 4<sup>e</sup> jour**
  - Élévation thermique modérée (38 – 38,5°), gonflement des seins
  - Délicat car enfant exigeant alors que sécrétion lactée commence à s'installer => soutien de la mère pour éviter le découragement
  - Les premiers jours : 7 à 9 tétées puis ensuite stabilisation à 6 tétées / jour => horaire souple !!
- ❑ **Hygiène** : Lavage des mains, nettoyage mamelons au sérum phy avant/après tétée, alimentation équilibrée, laitages, boissons
- ❑ **Pas d'OH, pas d'excitants, pas de tabac,**
- ❑ **Attention médicaments**

### • BENEFICES

- ❑ **Colostrum** (précédant montée laiteuse) : Valeur nutritive +++, facile à digérer/assimiler, riche en Ac = IgA => lutte contre infections, favorise la mise en route du transit intestinal
- ❑ **Lait maternel** (à partir du 4<sup>ème</sup> jour) : Composition parfaitement adaptée (+ pauvre en ptn, + riche en sucre), digestibilité parfaite, protège des infections dig et respi, recommandé chez enfant de ptt poids et particulièrement chez préma
- ❑ **Bénéfice psychologique, ms nécessite motivation => à conseiller sans imposer**

### • INHIBITION DE LA LACTATION

- ❑ **Si allaitement non souhaité => dès le jour de l'accouchement :**
  - Inhibiteur de la prolactine (bromocriptine, Parlodel\*, Norprolac\*) 2 cp/jour pendant 3 sem
  - Fractionner les prises les 1ers jours de ttt pour éviter **sensations vertigineuses**
- ❑ **Si inhibition de la lactation est nécessaire après montée laiteuse :**
  - Vidange + compression mammaire + restriction hydrique + diurétique (Lasilix 1 cp/j pdt qq j)
  - +/- Parlodel 3 cp/j 3 sem = totalement inefficace si après autonomisation de la glde mammaire
- ❑ **Si allaitement => arrêt spontané**

## • CI A L'ALLAITEMENT MATERNEL

- ❑ Maternelle : Maladie infectieuse, affection dermato du mamelon, tble psy (psychose puerpérale), médicament CI chez la mère
- ❑ Enfant : fente palatine, Anomalie du tube digestif ; déconseillé en cas d'incompatibilité foetomaternelle avec Mie hémolytique

## • COMPLICATIONS

### ➤ Complications non infectieuses

#### ❑ CREVASSES DU MAMELON

- Douleurs vives lors des tétées associées parfois à des saignements
- Fissures ou érosions radiées des mamelons qui apparaissent dès les premiers jours de l'allaitement
- Soins locaux : antiseptiques, pommades cicatrisantes, « bouts de sein » pour éviter transitoirement contact direct ou parfois sein au repos pdt 12 h avec vidange par massage manuel ou tire-lait
- Ttt surtt préventif : Education (afin d'éviter récides et complications) : tétées courtes, hygiène rigoureuse (nettoyage avt/après au sérum physiologique), soutien gorge en coton

#### ❑ ENGORGEMENT MAMMAIRE<sup>Q</sup>

- Vers 3<sup>e</sup> jour du post-partum, en général associé à retard de montée laiteuse que la femme tente de favoriser par boissons trop abondantes => seins tendus, durs et douloureux, se vidant mal
- Ttt est local : vider les seins sous une douche d'eau chaude<sup>D</sup>, antiinflammatoires locaux, petites doses d'ocytocine en IM<sup>D</sup> avant les tétées pour améliorer excréation lactée, en dernier recours : tire-lait électrique

### ➤ Complications infectieuses

#### ❑ LYMPHANGITE AIGÜE DU SEIN<sup>Q</sup>

- Complication secondaires à crevasses du mamelon en général
- Fièvre élevée 40° + frissons + sein inflammatoire douloureux avec placard lymphangitique rouge avec traînées inflammatoires<sup>Q</sup> se dirigeant vers l'aisselle, sans induration sous jacente, adénopathie axillaire
- Ttt anti-inflammatoire, soins locaux (compresses alcoolisées, cataplasmes à l'antiphlogistine) (+/- si besoin ATB antistaph)
- L'allaitement peut être continué<sup>Q+</sup> (le lait est propre)

#### ❑ GALACTOPHORITE

- Le lait est purulent => arrêt allaitement, antibiotiques

#### ❑ ABCES DU SEIN

- Constitution par voie canalaire à partir de crevasses négligées du mamelon
- Phase de galactophorite (présuppurative)
  - Tension douloureuse du sein, temp 38°, pas d'ADP, signe de Budin + (issue de lait mélangé à du pus laissant une tâche jaune sur la compresse) => prélèvement du pus pour bactério (staph aureus le + svt)
  - Ttt = Arrêt de l'allaitement (Parlodel 3 cp/j 3 sem), ATB (anti staph), Anti-inflammatoires
- Phase de mastite aiguë
  - Douleurs vives, AEG, température oscillante, sein très sensible avec noyau dur exquisément douloureux, ADP satellite
  - Pas d' ATB (Risque de passage vers abcès chronique) => attendre que abcès « murisse » et se collecte
- Phase de suppuration-collection (abcès)
  - Douleurs lancinantes pulsatiles insomniantes, temp 40°, Hyperleucocytose à PNN
  - Ramollissement du noyau + modifications de la peau en regard (rouge, succulente) (signes tardifs)
  - Ttt chir : incision + mise à plat + drainage

### ➤ Anomalies de la sécrétion lactée

- Insuffisances de sécrétion :
  - Agalactie totale (exceptionnelle, Sheehan)
  - Hypogalacties (facteur psychiques prepondérants (émotion, tendance dépressive), asthénie auxquels se surajoutent des facteurs alimentaires ou d'anomalie mammaire)
- Excès de sécrétion : hypergalactie n'est pas pathologique (incitation au don au Lactarium)

## *Modifications physiologiques et anatomiques des suites de couches (HP)*

### • RETOUR A LA NORMALE DE L'APPAREIL GENITAL

- Involution utérine
- Régénération de la muqueuse endométriale
- Modification du vagin et des OGE

### • MODIFICATIONS DE L'ORGANISME DANS LE POST-PARTUM

- Disparition de l'imprégnation hormonale gravidique :
- Oestrogènes réapparaissent à partir du 25<sup>e</sup> jour (reprise d'un cycle ovarien)
- Progestérone réapparaît lors de la reprise d'un cycle ovulatoire (après le retour de couches le + souvent)
  - => hypotonie des voies urinaires et des voies biliaires
  - => hypercoagulabilité (↑° fibrinogène, ↑° facteurs de coag, stase veineuse, œdème gravidique, ± anémie, sédentarité)